

Instrucciones Postoperatorias (para los siguientes 7-10 días)



No Lamer!

Lamer o masticar la incisión puede causar infección. Si se envía un collar/cono a casa manténgalo puesto durante todo el periodo de recuperación.

Mantenga la incisión/seca

El agua puede disolver el pegamento quirúrgico, esponjando suturas internas.




Revise la Incisión

La línea verde, pequeña, es el tatuaje que indica que su mascota está esterilizada.

Revise la incisión dos veces al día. Para ver si hay hinchazón, secreción y irritación. Como se mira la herida hoy es normal.

Mantenga los Animales Separados/as



Los machos aún pueden fecundar en hembras alteradas hasta 6 semanas después de la cirugía. Machos intactos pueden lastimar una hembra recientemente operada.

Las incisiones en los machos se dejan abiertas.

Se dejan abiertas para drenar, es normal ver un poco de secreción.

No le dé medicamento de humanos!



Los medicamentos para humanos pueden ser peligrosos y fatales. No le dé ningún medicamento que no haya sido recetado por un veterinario específicamente para su mascota. Su mascota ha recibido una inyección duradera para el dolor en el ombligo de la cirugía. Si lo enviaron a casa con medicamentos adicionales, dé los solo como se indica en la etiqueta.

Restringir la actividad

Durante el tiempo de curación, las mascotas deben mantenerse lo más tranquilas posibles. Los perros deben ser paseados con correa para evitar el sobre ejercicio.




Comida

Es normal que su mascota tenga náuseas hasta 24 horas después de la cirugía. No le cambie su comida porque puede causar molestia estomacal.

Aqua

A los perros se les debe dar una cantidad pequeña de agua en la noche. A las demás mascotas se le puede dar una cantidad normal.



Los siguientes síntomas deben tratarse de inmediato:

Encías pálidas; depresión/letargo; vómito persistente, pérdida de apetito, o diarrea que dura más de 24 horas después de la cirugía; secreción abundante o sangrado por incisión o vulva; dificultad al respirar; dificultad para defecar; disminución o signo de fatiga de ingestión de agua



Spay Memphis ofrece revisión de martes - viernes de 9 am - 2 pm, para cualquier complicación postoperatoria resultada directamente de la esterilización. Mande un correo electrónico a ingo@spaymemphis.org. O llame al 9013243202 para más información. Su veterinario de servicio completo debe tratar cualquier enfermedad o lesión que no está directamente relacionada con la cirugía de esterilización.

Spay Memphis no se hace responsable de ningún animal que requiera otra atención médica que no sea relacionada con la cirugía de esterilización. Si hay una emergencia cuando estamos cerrados pueden acudir a las siguientes por su cuenta

- Animal Emergency Center : 901-323-4563 (3667 Summer Avenue)
- Day & Night Animal Hospital: 901-500-7556 (4670 Summer Avenue)

