


Feral/Community Cat Post-Surgery Instructions

Leave Cat in Trap



Allow the cat to remain in the trap until fully awake and ready for release. This should be in a temperature controlled area. Cover trap loosely with light blanket or towel to minimize stress but allow space for them to get air.

Cleaning Cat Waste

Place newspaper, a tarp, plastic, etc. on the floor under the trap to catch urine, feces, and food that may fall from the trap. The trap should be carefully elevated on bricks, pool noodles, or other suitable objects to allow waste to fall to the floor so the cat is not lying in it. Please use good judgement so that the trap cannot topple over when the cat moves.

Food & Water



You may offer the cat water and small amounts of food at a time when they are fully alert. Wet food is best as it offers water intake as well and can be dropped into trap without opening it.

Monitoring

If this is a friendly community cat, it is recommended to monitor the incision if possible. A small amount of redness and swelling is normal. Opening of the incision or excessive bleeding at incision site is an emergency.

Ear Tipping



Feral/community cats' left ears are tipped to show they have been spayed/neutered and vaccinated. A small amount of bleeding is normal but will not persist. The ear tip scab will fall off naturally.

No Human Medication!



Human medication can be dangerous and fatal! Do NOT give any medication that is not prescribed by a veterinarian specifically for this cat. This cat has received a long-lasting pain injection at the time of surgery.



Incisions on MALES are left open

They are left open to drain. It is normal to see some discharge and some "oozing" for male cats.

Releasing the Cat

Once the cat is alert, clear-eyed, and shows no sign of illness, they may be released. Males can often be released the morning after surgery; Females may need to be kept for an additional day. Keeping/confining a feral/community cat longer than 48 hours often creates increased stress, which will prevent proper healing, so use best judgement when it comes to weather or extreme temperature when releasing. Always release the cat back where it was trapped and leave fresh food & water at release site.

The following symptoms should be addressed IMMEDIATELY:

pale gums; depression/lethargy; persistent vomiting, appetite loss, or diarrhea lasting more than 24 hours post-surgery; heavy discharge or bleeding from incision or vulva; difficulty breathing; difficulty with urination or bowel movements; or significantly decreased water or food intake lasting more than 24 hours post-surgery




Spay Memphis offers rechecks Tuesday - Friday from 9am - 2pm. However, a truly feral cat will have to be sedated (for a small fee) to be handled for a recheck so it is recommended to call (901-324-3202, press 1) or email (info@spaymemphis.org) to let us know the issue prior to coming in.

Spay Memphis cannot be held responsible for complications resulting from failure to follow post-op care instructions or for any animal requiring attention outside of our business hours. If there is an emergency when we are closed, you will need to take the cat, **at your own expense**, to a full service veterinary clinic or a clinic with extended hours, such as Animal Emergency Center (3667 Summer Avenue), Walnut Grove Animal Clinic (2959 Walnut Grove Road), or PriorityPet Urgent Care (1227 S Germantown Road)



Instrucciones posoperatorias para gatos callejeros o comunitarios

Deje al gato en la trampa



Deje que el gato permanezca en la trampa hasta que esté completamente despierto y listo para ser liberado. Esto debe hacerse en un área con temperatura controlada. Cubra la trampa sin apretar con una manta ligera o una toalla para minimizar el estrés, pero deje espacio para que pueda respirar.

Limpieza de desechos de gatos

Coloque periódico, una lona, plástico, etc., en el suelo debajo de la trampa para recoger la orina, las heces y la comida que pueda caer. La trampa debe elevarse cuidadosamente sobre ladrillos, flotadores de piscina u otros objetos adecuados para que los desechos caigan al suelo y el gato no se tumbe en ella. Tenga cuidado para que la trampa no se vuelque cuando el gato se mueva.

Comida y agua



Puedes ofrecerle agua y pequeñas cantidades de comida cuando esté completamente alerta. La comida húmeda es la mejor opción, ya que también le permite beber agua y se puede dejar caer en la trampa sin abrirla.

Escucha

Si se trata de un gato comunitario amigable, se recomienda vigilar la incisión si es posible. Es normal que haya un poco de enrojecimiento e hinchazón. La apertura de la incisión o un sangrado excesivo en el lugar de la incisión es una emergencia.

Punta de oreja



A los gatos ferales/comunitarios se les corta la oreja izquierda para indicar que han sido esterilizados/castrados y vacunados. Es normal que sangren un poco, pero no persistirá. La costra de la punta de la oreja se desprenderá naturalmente.

¡Sin medicamentos humanos!



¡Los medicamentos para humanos pueden ser peligrosos y mortales! NO administre ningún medicamento que no haya sido recetado por un veterinario específicamente para este gato. Este gato recibió una inyección analgésica de larga duración durante la cirugía.



Las incisiones en los HOMBRES se dejan abiertas

Se dejan abiertos para drenar. Es normal ver algo de secreción y supuración en los gatos machos.

Liberando al gato

Una vez que el gato esté alerta, con la vista lúcida y sin signos de enfermedad, podrá ser liberado. Los machos suelen ser liberados a la mañana siguiente de la cirugía; las hembras podrían necesitar quedarse un día más. Mantener o confinar a un gato salvaje o comunitario durante más de 48 horas suele generar mayor estrés, lo que dificultará la recuperación adecuada, así que use su criterio en cuanto al clima o las temperaturas extremas al liberarlo. Siempre libere al gato en el lugar donde estuvo atrapado y deje comida y agua frescas en el lugar de liberación.

Los siguientes síntomas deben abordarse INMEDIATAMENTE:

encías pálidas; depresión/letargo; vómitos persistentes, pérdida de apetito o diarrea que dura más de 24 horas después de la cirugía; secreción abundante o sangrado de la incisión o la vulva; dificultad para respirar; dificultad para orinar o defecar; o ingesta de agua o alimentos significativamente reducida que dura más de 24 horas después de la cirugía



Spay Memphis ofrece revisiones de martes a viernes de 9:00 a. m. a 2:00 p. m. Sin embargo, un gato verdaderamente salvaje deberá ser sedado (por una pequeña tarifa) para ser sometido a una revisión, por lo que se recomienda llamar al 901-324-3202 (presione 1) o enviar un correo electrónico a info@spaymemphis.org para informarnos del problema antes de acudir.

Spay Memphis no se responsabiliza por complicaciones derivadas del incumplimiento de las instrucciones de cuidados postoperatorios ni por cualquier animal que requiera atención fuera de nuestro horario de atención. En caso de emergencia durante nuestro horario de atención, deberá llevar al gato, a su propio costo, a una clínica veterinaria de servicio completo o a una clínica con horario extendido, como el Centro de Emergencias Veterinarias (3667 Summer Avenue), la Clínica Veterinaria Walnut Grove (2959 Walnut Grove Road) o PriorityPet Urgent Care (1227 S Germantown Road).

